

GreenRange DE

Verwendung

Stäubemittel gegen Rote Vogelmilbe, Ameisen, Schaben sowie andere kriechende Insekten zur Verwendung in Innenräumen in Geflügelställen, in industriellen und institutionellen Bereichen sowie in Privathaushalten. Bei Ameisen auch zur Verwendung im und um das Haus herum, im Freien nur bei trockener Witterung. Für berufsmäßige Verwendung.

Typ

Stäubemittel (DP).

Wirkstoff

Siliciumdioxid/Kieselgur 1000 g/kg (100 %),
Cas-Nr. 61790-53-2.

GreenRange DE besteht zu 100 % aus Siliciumdioxid/Kieselgur (auch Diatomeenerde genannt). Der Wirkstoff besteht aus Schalen fossiler Kieselalgen, einer natürlich vorkommenden Form von amorphem (nicht-kristallinem) Siliciumdioxid. Der Wirkstoff führt zum Herauslösen von Kutikula fetten und zur Dehydrierung der Insekten. Die Schädlinge sterben nach wenigen Stunden ab.

Wirkung

Bio-physikalische Langzeitwirkung.

Besonderheiten

- Hohe Wirksamkeit.
- Lange Wirkungsdauer und Schutz gegen Neubefall.
- Keine Resistenzbildung.
- Einfache Anwendung.
- Biozid-Zulassungsnummer:
DE-0028100-01-0001-18
CH-2022-0010

Bedarf

Empfohlene Aufwandmenge siehe Etikett. Schädlinge stäuben sich als Folge ihrer Eigenaktivität selbst ein bzw. werden bei der Anwendung eingestäubt. Der Wirkstoff führt zum Herauslösen von Kutikula fetten und zur Dehydrierung der Insekten. Die Schädlinge sterben nach wenigen Stunden ab. Bei niedrigen Temperaturen bzw. erhöhter Luftfeuchtigkeit kann sich die Wirkung um 1 – 2 Tage verzögern.

Anwendung

Innenanwendung in trockener Umgebung gegen kriechende Insekten (z. B. Ameisen, Schaben) und Rote Vogelmilbe:

Stäuben durch Besprühen: Besprühen von Oberflächen (Rote Vogelmilbe), Ritzen und Spalten bei Schaben, Laufwegen von Insekten (Ameisen) und Verstecken mit einem handbedienten Stäuber (z. B. den im Lieferumfang enthaltenen Stäuber).

Bei Küchenschaben:

Als Ritzen- und Spaltenbehandlung in Ritzen, Spalten und Hohlräumen auftragen, in denen sich die Insekten aufhalten können. Auf die Laufwege der Insekten auftragen. Bei Ameisen: auf die Laufwege der Insekten auftragen.

Anwendung gegen die Rote Vogelmilbe im Geflügelstall:

Besprühen von Oberflächen. Zur Behandlung von Insekten in Hühnerställen ist die Umgebung zu behandeln. Nicht direkt auf das Geflügel auftragen.

Vorbeugend: Anwendung im sauberen und trockenen Geflügelstall vor dem Einstellen der Tiere. Ausreichend Produkt aufsprühen, so dass sämtliche Oberflächen mit einem weißen Film bedeckt sind (ca. 50 g/m²).

Bekämpfend: wobei sich die Tiere außerhalb des Geflügelstalls befinden. Ausreichend Produkt aufsprühen, so dass sämtliche Oberflächen mit einem weißen Film bedeckt sind (ca. 50 g/m²).

Wenn möglich, direkt auf den Insekten anwenden. Auch Ritzen und Spalten, Hohlräume und Laufwege oder alle anderen Stellen behandeln, an denen sich die Milben verstecken oder eindringen können.

Barrierebehandlung mittels Stäuben gegen Ameisen im Freien:

Falls mehrere Nesteingänge vorhanden sind, das Produkt gleichmäßig auf alle Eingänge auftragen. Das Produkt wird rund um die Nestöffnung und auf die Ameisenstraßen aufgetragen. Wiederholen Sie die Behandlung, wenn die Ameisen nach 24 Stunden das gesamte Produkt entfernt haben. Nicht mehr als 3 Mal/Nest anwenden. Das Produkt nicht anwenden, wenn innerhalb der nächsten 24 Stunden Regen erwartet wird.

Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen.

Bei Anwendung in Geflügelställen:

Nur in leeren Ställen anwenden.

Futtermittel vor Anwendung entfernen.

Fütterungsbereiche mit Plastikfolie abdecken.

Alle Wasserspeichertanks vor der Anwendung abdecken.

Nicht direkt auf Schlafplätze sprühen.

Bei Anwendung in industriellen und institutionellen Bereichen sowie in Privathaushalten:

Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutztieren oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen könnten. Lebensmittel vor Anwendung entfernen.

Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Säuglinge, Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere unzugänglich sind, oder unzugänglich für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere ausbringen.

Nicht in Gegenwart anderer Personen, insbesondere von Kindern oder Haustieren, anwenden.

Die Entfernung des Produkts und der Abfälle sollte durch Nassreinigung erfolgen.

Während der Behandlung und der Entfernung des Produkts sollte nicht gesaugt werden.

Die Verwendung der Gießflasche auf die Erzeugung von Barrieren von maximal 2 Meter pro Tag beschränken.

Vorsichtsmaßnahmen

Kann die Organe schädigen (Lunge) bei längerer oder wiederholter Exposition. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Staub/Aerosol nicht einatmen. Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/kantonalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

EntsorgungFür das Produkt

Von einer Entsorgung in das Abwasser ist abzuraten.

Örtliche/nationale Vorschriften beachten.

Bei verunreinigtem Verpackungsmaterial

Örtliche/nationale Vorschriften beachten.

Behälter vorsichtig entleeren.

Nicht verunreinigte Verpackungen können recycelt werden.

Für die Schweiz gilt zusätzlich: Inhalt / teilentleerter Behälter dem Sonderabfall zuführen.

Verpackung

Plastikeimer mit 2 kg.